



العناية بالحبل السري للطفل بعد الولادة

تكثر التساؤلات حول كيفية الإعتناء بسرة المولود؟ متى تسقط؟ وهل يدل تأخر سقوطها عن أسبوعين علي مرض ما؟ وماذا يعني نزف السرة؟ ماذا يعني فتق السرة؟ وهكذا.. بداية وظيفة الحبل السري خلال الحمل هي تأمين الغذاء للجنين عبر الدم الواصل من الأم بواسطة شريانين ووريد داخل هذا الحبل.

و عند الولادة يقوم الطبيب بقطع هذا الحبل بأداة معقمة على بعد 1 الى 2سم من منشأ الحبل من سرة الطفل , و وبعد قطعه تضغط الأوعية بواسطة ملقط خاص للتعقيم , و يبدو الحبل السري بعدها كقطعة لحمية شفافة يمكن رؤية لون الدم من خلالها.. إذن فهي قطعة لحمية حساسة يجب الاعتناء بها جيدا

العناية بالحبل السري لدي الاطفال حديثي الولادة



عمل طلاب الفرقة الثالثة



كيف تكون العناية بسرة الطفل حديث الولادة؟

يجب الحفاظ على السرة نظيفة و معقمة قدر الإمكان لمنع الإلتان و لتسريع سقوطها و ذلك كما يلي:
1. يجب غسل السرة بالكحول الطبي يوميا و لعدة مرات و من

كل الجهات ، و هذا لا يسبب أي ألم للطفل و وقد ينزعج قليلاً من برودة الكحول

2. يجب الحفاظ على منطقة السرة و ما حولها نظيفة و جافة
3. قم بتعريض السرة لهواء الغرفة بشكل متكرر قدر الإمكان
4. توجد أنواع من فوط الاطفال ذات حواف خاصة لتجنب الاحتكاك مع سرة الطفل و هي مفيدة
5. استخدم اسفنجة طرية خلال حمام الطفل و لا مانع من غسل السرة بالماء و الصابون



6. لا يجوز وضع الكحل او أي مستحضر آخر على السرة عدا الكحول الطبي او مطهر طبي يصفه الطبيب

ما هي أعراض التهاب السرة عند الطفل؟

1. عندما تصبح قاعدة السرة محمرة و متورمة
2. استمرار النزف الدموي و النزف من السرة
3. خروج سائل أصفر او القيح من السرة و ما حولها

ما هو الورم الحبيبي في السرة Umbilical Granuloma ؟

هو عبارة عن كتلة رخوة بيضاء أو زهرية اللون ، تفرز مادة صفراء من السرة ، و يحدث الورم بعد سقوط السرة و لا يترافق مع التورم أو الاحمرار أو سخونة السرة ، و ه وغير مؤلم لأنه لا يوجد فيه أعصاب ، و سببه قد يكون انتان موضعي بسيط ، و أكثر حالات الورم الحبيبي في السرة تشفى لوحدها مع الاستمرار بتطبيق الكحول خلال أسبوع ، والحالات الأخرى تعالج بكي الورم بنترات الفضة أو ربط الورم إذا كان له عنق

ما هو فتق السرة umbilical hernia ؟

هو كبر حجم الفوهة التي كان يخرج منها الحبل السري لدرجة أنه بعد سقوط السرة لا تغلق هذه الفتحة و تنتفخ عند ضحك أو بكاء الطفل ، و هو لا يشكل أي خطر و ليس بسبب بكاء الطفل ولا يكبر بعد الولادة ، و أكثر الحالات تشفى لوحدها ، و لا يفيد تطبيق الرباط الخاص أو أي لاصق على الفتق ، و الجراحة تكون ضرورية فقط في حال لم ينغلق الفتق بعمر 4 سنوات



يختلف ذلك من طفل لآخر و عادةً تسقط السرة بعد 10 أيام إلى أسبوعين من الولادة و حالات قليلة قد يتأخر فيها سقوط السرة لمدة شهر أو أكثر. وغالباً لا يدل تأخر سقوط السرة لأكثر من أسبوعين على مشكلة صحية و حالات نادرة قد يكشف فيها نوع من نقص المناعة عند الطفل (خلل التصاق الكريات البيضاء)

هل يدل نزف الدم او نز الدم من السرة على مرض ما ؟

النزف البسيط لمشحات من الدم هو أمر طبيعي لعدة أيام بعد الولادة (ملاحظة نقطة دم جافة على ملابس الطفل فوق السرة) ، والنزف الغزير (تبقع ثياب بالدم الطفل بكثرة فوق السرة او عودة النزف بعد تجفيف نقطة الدم التي على السرة) قد يشير لمشكلة في ربط السرة أو لالتهاب موضعي و في حالات نادرة قد يكشف الداء النزفي – النزف عند حديث الولادة



4. تألم و انزعاج الطفل



متى يجب استشارة طبيب الأطفال بخصوص سرة الطفل ؟

عندما يفلت أو يرتخي ملقط السرة – عند ملاحظة علامات الالتهاب – عند النزف الدموي غير الطبيعي، هنا يجب استشارة الطبيب

متى تسقط سرة الطفل ؟

هل يدل تأخر سقوط السرة لأكثر من أسبوعين
على

مشكلة صحية ما عند حديث الولادة ؟

